

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Avertissement destiné aux Agriculteurs du Lauragais, de la Piège et du Razès  
"rédigé en collaboration" avec les GDA, les Coopératives et la ferme de Loudes

N° 20 C du 22/05/92

GRANDES CULTURES N° 4

\* \* \* \* \*

\* BLE : Pas d'évolution des maladies \*

\* Attention à la FUSARIOSE \*

\* \* \* \* \*

\* TOURNESOL : Phomopsis RAS \*

\* \* \* \* \*



\* \* \* \* \*

\* OÏDIUM \*

\* \* \* \* \*

Les dernières observations du réseau font ressortir une  
régression de l'Oïdium.

\* \* \* \* \*

\* SEPTORIOSES \*

\* \* \* \* \*

Pas d'évolution.

\* \* \* \* \*

\* ROUILLE BRUNE \*

\* \* \* \* \*

Aucune progression de la Rouille Brune, observable comme la  
semaine précédente mais à l'état de traces.

\* \* \* \* \*

\* FUSARIOSE DES EPIS \*

\* \* \* \* \*

Une période pluvieuse sur l'épiaison, et plus particulière-  
ment pendant la floraison, avec des températures élevées,  
constituent des éléments favorables à la fusariose des épis.

Les parcelles épiées sont normalement protégées à la suite de notre avertissement N°3  
du 14 mai, ces cultures sont celles du Razès et du Sillon.

Les zones plus tardives de la Piège vont arriver à ce stade, il convient de les  
protéger dès l'épiaison terminée ou presque terminée de 10-4 à 10-5.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



\* \* \* \* \*

Nous n'avons pas trouvé au cours de nos tournées de parcelles avec des épis colonisés. Observez vos cultures et si vos champs sont au seuil, traitez.

Seuil : 1 épi sur 2 colonisé par au moins 1 puceron.

Traitement fongicide conseillé à l'Épiaison :

HORIZON .....	1 L/Ha	performants sur
LIBERO .....	1.5 L/Ha	Fusariose
SPOT .....	1.5 L/Ha	
PUNCH CS .....	0.8 L/Ha	
PLANETE R .....	1.5 L/Ha	
SUMISTAR .....	2.5 L/Ha	
ALTO .....	0.8 L/Ha	
TENERE .....	2 L/Ha	

Nous vous renouvelons les conseils de prudence pour les applications de fongicides céréales pendant les périodes de forte chaleur et de faible hygrométrie. Traitez très tard le soir ou le matin très tôt, précautions absolument indispensables pour les spécialités contenant du TEBUCONAZOLE <<HORIZON et LIBERO>>.

"En cas de présence de Pucerons"

PIRIMOR G .....	0.250 Kgs/Ha
KARATE .....	0.125 L/Ha
DECIS CE .....	0.250 L/Ha
TALSTAR .....	0.050 L/Ha
BAYTHROID .....	0.300 L/Ha
FULL EW .....	0.300 L/Ha

Le mélange des fongicides HORIZON et LIBERO n'est possible qu'avec des Pyréthriinoïdes formulation FLO (Ex: DECIS FLO, FULL EW)  
Les formulations EC risquent d'entraîner des bouchages de jets en raison d'incompatibilité physique.

## TOURNESOL

\* \* \* \* \*

Pas de projections d'Ascospores pour le moment, aucun traitement n'est donc à envisager sur ces cultures.  
De nouveaux avis feront le point sur l'évolution du risque.

## MAIS

Un prochain avis spécialisé fera le point sur le risque Sésamie.